

როგორც ყველა ფარმაცოლოგიურმა საშუალებამ, ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინამ შესაძლოა გამოიწვიოს ლოკალური და ზოგად ალერგიული რეაქციები, როგორებიცაა:

- საინექციო არის გამაგრება, ტკივილი, შეწითლება, შესიება და ქავილი;
- სიცხე, შემცვინება, გონების დაკარგვა, ასთენია, თავის ტკივილი, ძილიანობა, ართრალგია, მიალგია, გულისრევა და მუცლის ტკივილი;
- იშვიათად შესაძლებელია განვითარდეს ანაფილაქტოიდური რეაქცია და გამონაყარი;
- აცნობეთ ექიმს თუ გაქვთ ალერგია ნეომიცინის მიმართ;
- აცნობეთ ექიმს, თუ ვაქცინაციის პერიოდში სხვა ჩვენებების გამო უნდა მიიღოთ კორტიკოსტეროიდები ან იმუნოსუპრესიული მედიკამენტები (ქიმიოთერაპია, ანტიმალარიული, ანტირევმატოიდული მკურნალობა);
- კვების რაციონის ცვლილება არ არის რეკომენდებული;
- ალკოჰოლის მიღება იმუნიზაციის პერიოდში ხელს უშლის იმუნიტეტის ჩამოყალიბებას.

ჯერ დღეში _____ დღე

სამახსოვრო შედგენილია

WHO 2013 წლის #SEA-CD-278-დოკუმენტის რეკომენდაციების მიხედვით

ექიმთან ვიზიტის დროს აუცილებლად წარმოადგინეთ ანტირაბიული ვაქცინაციის ბარათი.

მობრძანდით 09:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე

ანტირაბიული ვაქცინაციის ბარათი



გვარი: _____

სახელი: _____

მომართვის თარიღი: _____

თქვენ უნდა გამოცხადდეთ აცრებზე:

დღე	მომდევნო აცრის თარიღი	აცრის თარიღი
0		
3		
7		
14		
28		
90		

სამახსოვრო ცოფის საწინააღმდეგო აცრების დროს

ცოფის თავიდან ასაცილებლად ერთადერთი საშუალებაა ანტირაბი-
ული აცრა, რომლის ეფექტურობა დამოკიდებულია სამედიცინო დახ-
მარებისათვის მიმართვის ვადებზე.

ყოველი დაპარგული დღე სიცოცხლისათვის სახიფათოა.

დაიმახსოვრეთ:

ცოფით დაავადება შეიძლება თავიდან აიცილოთ, მაგრამ მისი გან-
კურნება შეუძლებელია.

- ექიმის მიერ დანიშნულ დროს ზუსტად გამოცხადდეთ აცრაზე;
- ექიმის გარეშე არ შეწყვიტოთ აცრები;
- ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ან მის შემდგომ პერიოდში
სხვა აცრების ჩატარების აუცილებლობის შემთხვევაში საკონსულ-
ტაციოდ მიმართეთ ექიმს.

აღნიშნული წესების დარღვევა ხელს უშლის ცოფის წინააღმდეგ
იმუნიტეტის გამომუშავებას, შეიძლება ვერ აიცილოს თავიდან დაა-
ვადების განვითარება ან გამოიწვიოს მძიმე გართულებები ნერვული
სისტემის მხრივ.